

簡易醫藥箱衛材卡

項次	品名	數量	使用方法	有效期限	備註
1	生理食鹽水 (20ml)	3 瓶	沖洗/清潔傷口		開瓶後當天未用完應丟棄
2	無菌小棉棒	1 包	清潔傷口/塗擦藥膏		開封後未用完應將開口處密封
3	無菌紗布 (4x4、3x3、 2x2)	各1~2包	覆蓋保護傷口		開封後未用完應將開口處密封
4	紙膠及切台	1 組	黏貼固定敷料(紗布)		
5	OK 繃	1 盒(包)	覆蓋保護傷口		
6	燙傷藥膏	1 條	患處局部塗敷		視需求選配
7	抗生素藥膏	1 條	患處局部塗敷		視需求選配
8	彈性繃帶	1 捲	固定保護關節		視需求選配
9	三角巾	1 條	固定保護患肢		視需求選配

【備註:每半年檢查藥品是否過期或汙損,予以替換新藥品】健康中心 關心您!!分機 5754 & 6449

國立臺灣師範大學實驗室/實習工廠醫藥箱經營囑指示用藥品項建議與使用說明

藥品名稱 (商品名)	學名	包裝描述1	成分規格	製造廠/ 供應商	劑量(單位)	用藥途徑	常用處方 頻次	副作用(發生 率高一低)	適應症	用藥須知	絕對禁忌併 用藥	保存溫度
紐約新徽素 軟膏	Neomycin Sulfate		28GM 軟膏 劑	人人化學 製藥股份 有限公司	5 mg/ GM	皮膚外用	2-3次/日 (依醫囑使 用)	過敏性皮膚 炎、繼發性感 染等	急救、預防及 減緩皮膚刀 傷、刮傷、燙 傷之感染。	1. 此藥品為廣效抗生 素，用以治療細菌感 染，請依照醫師指示 使用。 2. 若使用後自覺狀況 未改善或更惡化，應 立即停藥就醫。	有過敏史者	室溫
灼膚星乳膏	Silver Sulfadiazine		乳膏 1% 50克	榮民製藥 股份有限 公司	10 MG/GM	皮膚外用	2-4次/日 (依醫囑使 用)	皮膚發疹、灼 熱感、搔癢等	治療或預防 燒、燙傷引起 之感染症	1. 早產兒及出生一個 月內新生兒不宜使用本 藥品。 2. 對磺胺類過敏或有 蕁麻疹者，不建議使 用本藥品。 3. 一般用法為每日塗 敷1-2次，厚度約1.5- 2mm，覆蓋燒燙傷之部 位。	(1) 曾對本 品過敏者， 禁止使用。 (2) 對磺胺 類藥品過敏 者，禁止使 用。 (3) 請勿塗抹 於眼睛或粘 膜。	室溫(15- 30°C)儲存， 避免陽光直 接照射

傷口換藥護理指導

不同傷口種類有不同的照顧方法。以下為一般居家傷口的照顧指導（詳細情形仍以專業醫護人員直接評估建議為準）：

一、換藥用品準備：無菌棉花棒、生理食鹽水（單次使用）、所需敷料、膠帶。

二、傷口換藥程序：

1. 洗手。
2. 露出傷口部位，注意病人之感受及隱私、保暖。
3. 以手取下膠帶及傷口敷料，勿碰到傷口，敷料丟在垃圾袋內，若傷口與敷料黏很緊則用生理食鹽水沾溼再用乾棉棒將髒敷料剝開取下。
4. 觀察傷口癒合情形，有無紅腫、分泌物及味道，必要時與醫護人員聯繫，以進一步處理方式。
5. 將所需換藥用物打開。
6. 用生理食鹽水清洗傷口，棉棒應從傷口中間由內往外環狀輕拭，避免將外圍髒污細菌帶回傷口中；待其乾燥後，再使用所需敷料（敷料必須要大於傷口 2 吋，以免傷口受污染）。
7. 通氣膠布固定最好與傷口處肌肉走向成垂直。